

Delta SHAOLIN ^{MR}

Registro: RSCO-URB-INAC-103L-305-394-06

Insecticida / cápsulas en suspensión

Delta SHAOLIN es un insecticida piretroide sintético de tercera generación a base de gamma cialotrina recomendado su uso en áreas exteriores para el control de plagas en áreas públicas como basureros, mercados y el control de insectos vectores transmisores de enfermedades. es activo contra especies que han desarrollado tolerancia a insecticidas organofosforados y carbamatos. No se acumula en el medio ambiente. Antes de aplicar se debe limpiar el área de acceso de las plagas.

Delta SHAOLIN se maneja en presentación de: 1 Lt, 250ml y 100ml,

PLAGA	DOSIS (ml / L de agua)	SITIOS DE APLICACIÓN
MOSCAS (<i>Musca doméstica</i>)	Voladores: 15-20 ml.	HOTELES RESTAURANTES
MOSQUITOS (<i>Aedes spp</i> , <i>Anopheles spp</i> , <i>Culex spp</i>)		MERCADOS
CUCARACHAS (<i>Blatella germánica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i>)	Rastreros: 10 ml.	INDUSTRIA
HORMIGAS (<i>Monomorium pharaonis</i> , <i>Lasius Niger</i> , <i>Solonepsis spp</i>)		ALMACENES
CHINCHES (<i>Cimex lectularius</i>)	Arácnidos: 15-20 ml.	OFICINAS
PULGAS (<i>Pulex irritans</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>C. felis</i>)	5- 10 ml.	EDIFICIOS
ARAÑAS (<i>Lactrodectus spp</i>)	Voladores: 15-20 ml.	CASAS
ALACRANES (<i>Centuroides spp</i> , <i>Vejovis spp</i>)	Un litro rinde 25m2 de superficie o 100 metros lineales en banda.	CINES TEATROS ESCUELAS

INTERVALO DE APLICACIÓN: Cada 15 a 21 días, en infestación alta.

TIEMPO DE REENTRADA A ÁREAS TRATADAS: 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación.

CONTRAINDICACIONES: Evite el contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte, ya que puede inactivar el producto. No se recomienda aplicar el producto en áreas cerradas mientras éstas se encuentran ocupadas por personas o animales.

Si requiere mayor información, no dude en consultar a nuestro equipo técnico Delta

